

Sáfer SL

BIOCONTROLADOR TIPO PRODUCTO BIOQUÍMICO
CONCENTRADO SOLUBLE
REGISTRO DE VENTA No. 12183
CATEGORIA TOXICOLÓGICA III (MEDIANAMENTE TÓXICO)

CARACTERÍSTICAS	
INGREDIENTE ACTIVO	Extracto vegetal de la familia Asterácea 100 g/L Sales potásicas de ácidos grasos 450 g/L
APARIENCIA	Verde
OLOR	Característico
pH AL 10 %	8.5 - 10
DENSIDAD	0.95 - 1.2 cc/L
BIODEGRABILIDAD	100 %
VIDA ÚTIL	2 años
PRESENTACIÓN	250 cc, 1, 4, 20, 60 y 200 litros

Emplear Sáfer SL® de acuerdo a la especie y cultivo a tratar (ver cuadro).

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.R (Horas)	P.C (Días)
Pastos	<i>Collaria</i> spp.	2 cc/Litro Efectuar 2 aplicaciones después del pastoreo o durante de los primeros 30 días después de emergencia	N.A	N.A
Banano (<i>Musa AAA</i>) y Plátano (<i>Musa AAB</i>)	<i>Dysmicoccus</i> sp.	2 cc/Litro Efectuar 3 aplicaciones espaciadas cada 10 días		

P.C .Periodo de Carencia: Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha

P.R. Periodo de reingreso: Periodo de tiempo para el reingreso a los lotes tratados

N.A. No aplica