



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingredientes activos: Isoprothiolan + Kasugamicina
Concentración: 400 g / l + 20 g / l
Grupos químicos: Ditiolanos + Antibióticos

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Doble mecanismo de acción (Combinación de dos ingredientes activos)	* Protege interna y externamente la planta limitando la propagación de la enfermedad en los nuevos brotes. * Excelente en programas de Rotación. Garantiza el buen manejo de la susceptibilidad de los fitopatógenos (Hongos y Bacterias). * Alta eficacia en el control de enfermedades ocasionadas por hongos y bacterias.
Acción preventiva, translaminar y sistémica	* Uso preventivo y curativo.
Efecto residual	* Efecto prolongado y contundente.
Formulación líquida	* Rápida acción. * Evita pérdidas por lluvia.
Efecto prolongado y contundente	* Disminución de costos.

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
ARROZ <i>Oryza Sativa L</i>	<i>(Pyricularia oryzae)</i>	1.5 L / Ha.	48 Horas	14 días

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A: No aplica.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: Se recomienda hacer una prueba de fitocompatibilidad previa a la aplicación comercial. No se han observado efectos fitotóxicos aplicando en las dosis y cultivos de la recomendación de uso.

Compatibilidad: Se Se recomienda hacer una prueba de compatibilidad de mezcla previa a la aplicación comercial.

PRESENTACIONES 4 y 20 litros

MODO DE ACCIÓN

Fungicida y bactericida sistémico con actividad preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

Impide la incorporación de aminoácidos en los sistemas ribosomáticos de las bacterias y de los hongos en el proceso de síntesis de proteínas. Se incorpora a la planta por vía radicular y foliar. Aplicado para el control de Pyricularia afecta a la formación de apresorios, impide la penetración del hongo en la planta. Afecta la respiración y división celular del patógeno y suprime el desarrollo de las hifas impidiendo el avance de la infección. Cacique 420 SC inhibe la esporulación por lo cual posee acción preventiva y curativa al aplicarse foliarmente.