

FICHA TECNICA

Cantus®

boscalid

Fungicida / Gránulos dispersables

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Boscalid: 2-Cloro-N-(4'-chlorobifenil-2-il) nicotinamide..... (Equivalente a 500 g de i.a./ kg)	50.0 %
INGREDIENTES INERTES: Antiespumante, dispersante, portador, impurezas y compuestos relacionados.....	50.0 %
TOTAL:	100.0%

REG. RSCO-FUNG-0301V-301-034-050

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO EN MÉXICO POR: BASF MEXICANA S.A. DE C.V.

AV. INSURGENTES SUR 975,
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,
C.P. 03710 CIUDAD DE MÉXICO
TEL: 01 (55) 5325-2600

INSTRUCCIONES DE USO

Cantus® es un producto con presentación en gránulos dispersables que contiene como ingrediente activo al boscalid. Este producto se utiliza para el control de las siguientes enfermedades.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS DE PRODUCTO EN Kg/ha	OBSERVACIONES
FRESA (0)	MOHO GRIS <i>Botrytis cinerea</i>	1.0 a 1.2	Iniciar las aplicaciones en

TOMATE (jitomate) (0) TOMATE DE CASCARA (0) BERENJENA (0) CHILE (0) CHILE BELL (0)	PUDRICIÓN <i>Botrytis cinerea</i> TIZON TEMPRANO <i>Alternaria solani</i>	1.0 a 1.2 0.15 a 0.20	forma preventiva o cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Hacer aplicaciones a intervalos de 7 a 10 días.
ROSAL (SL)	MOHO GRIS <i>Botrytis cinerea</i>	1.0 a 1.2	
PAPA (0)	TIZON TEMPRANO <i>Alternaria solani</i>	0.15 a 0.20	Hacer las aplicaciones a intervalos de 5 días. Época de aplicación en tuberización.
FRAMBUESA (SL) ZARZAMORA (SL) ARÁNDANO (SL) GROSELLA (SL) FRESA (SL)	MOHO GRIS <i>Botrytis cinerea</i>	0.8 a 1.2	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación 850 – 950 L de agua / ha.
CEBOLLA (7) AJO (7) PORO (7) ESPÁRRAGO (7) CEBOLLÍN (7)	MOHO GRIS <i>Botrytis alli</i>	0.8 a 1.2	Realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecten los primeros síntomas; volumen de aplicación 750 – 850 L de agua / ha.
CULTIVOS EN CONDICIONES DE AGRICULTURA PROTEGIDA			
CALABAZA (SL) CALABACITA (SL) MELÓN (SL) PEPINO (SL) SANDÍA (SL)	MANCHA FOLIAR <i>Corynespora cassicola</i>	0.75 a 1.25 g / L	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550 – 650 L de agua / ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL= Sin límite

Tiempo de reentrada: 3 horas después de la aplicación, o una vez secada la aplicación.

Métodos para preparar y aplicar el producto.

Aplique las dosis de **Cantus**[®] recomendadas en la etiqueta con equipo terrestre. El equipo debe ser revisado y calibrado frecuentemente.

Aplicar el producto cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad empleando las dosis bajas y cuando el desarrollo de la enfermedad sea favorable se emplea la dosis más alta.

Se debe tener cuidado de diluir el producto en suficiente cantidad de agua para asegurar una buena cobertura del follaje.

Contraindicaciones.

No aplicar el producto cuando la velocidad del viento sea fuerte (más de 15 km/hora).

Cantus[®] no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados.

Incompatibilidad.

No se recomienda hacer mezclas de **Cantus**[®], con fungicidas e insecticidas ó productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda hacer pruebas previas para poder utilizar el producto en mezclas, y sólo deberán utilizarse productos autorizados y registrados ante la COFEPRIS.

“Manejo de Resistencia”.

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

Con el objetivo de mantener la efectividad de **Cantus**[®], se sugiere apegarse a las siguientes estrategias: **Cantus**[®] puede aplicarse un máximo de 2 veces seguidas y debe alternarse con otro fungicida que pertenezca a un grupo químico diferente y con diferente modo de acción efectuando un mínimo de 2 aplicaciones y posteriormente se podrá aplicar nuevamente **Cantus**[®] otras 2 veces seguidas como máximo. No aplicar más de 4 veces **Cantus**[®] por ciclo.

INFORMACIÓN ADICIONAL: custodia@basf.com