



CHAMUCO 300 OD
INSECTICIDA AGRÍCOLA
DISPERSIÓN OLEOSA (OD)
REGISTRO ICA No. PL0002622022
A NOMBRE DE AGROCONSULTORÍAS SAS

FICHA TÉCNICA

CHAMUCO 
300 OD



INGREDIENTES ACTIVOS:

Imidacloprid 210 g/L
Beta-cyfluthrin 90 g/L
Inertes c.s.p. 1 L

MODO DE ACCIÓN:

CHAMUCO 300 OD es una mezcla de un insecticida piretroide y un insecticida neonicotinoide (cloronicotinílico). Imidacloprid es altamente sistémico y tiene efecto por ingestión y contacto; Beta-cyfluthrin tiene efecto de contacto esencialmente, esta característica le da propiedades de alta eficacia contra comedores de follaje y chupadores. Actúa uniéndose en forma post-sináptica a los receptores nicotinérgicos y afecta el canal de sodio, en el sistema nervioso de las plagas.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PC	LMR	PR
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Cucarro (<i>Eutheola bidentata</i>)	0.175 L/Ha	22 días	0.01 mg/Kg ¹	4 horas
				0.01 mg/Kg ²	

PC: Período de carencia. Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

PR: Período de reentrada. Intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área o cultivo tratado.

LMR: Límite máximo de residuos. Fuente: Imidacloprid¹: European commission; Beta-cyfluthrin²: European Commission.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar una sola aplicación por ciclo de cultivo. Aplicar al momento de aparición de la plaga, dentro de un programa de manejo integrado de plagas, rotando con otros Insecticidas de diferente modo de acción o grupo químico para evitar el desarrollo de la resistencia. Realizar monitoreos de las plantas para definir la aplicación.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA: Revise y calibre bien los equipos. Se recomienda usar boquillas de cono hueco y un tamaño de gota de 250 µm aprox. y a presión constante. Use un volumen de 150 a 200 L/ha de agua según el estado de desarrollo del cultivo.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

Nocivo en caso de Ingestión
Nocivo en contacto con la piel
Nocivo si se inhala

Muy tóxico para organismos
acuáticos

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4
LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO

