CLOSTRISAN P

Vacuna inactivada para la prevención de las enfermedades Clostridiales y Pasteurelosis en bovinos, ovinos y caprinos.

Suspensión inyectable Subcutánea o Intramuscular.

COMPOSICIÓN:
Cada dosis de 5 ml contiene:

ANTIGENO	CANTIDAD/TITULACIÓN POR DOSIS
Clostridium perfringens tipo D	≥ 100 L +
Clostridium novyi tipo B	≥ 5 L +
Clostridium septicum	≥ 10 L +
Clostridium chauvoei	$\geq 10^9$ UFC
Clostridium haemolyticum	$\geq 10^9$ UFC
Clostridium sordellii	$\geq 10^9$ UFC
Pasteurella multocida Tipo D	$\geq 10^9$ UFC
Mannhemia haemolytica Tipo 1	$\geq 10^9$ UFC
Excipientes c.s.p.	

PROPIEDADES:

Vacuna inactivada potente (genera un nivel de inmunidad similar al que se obtendría si se aplicara cada antígeno de forma individual) y segura (no genera reacciones locales en el punto de inoculación, ni desencadena cuadros febriles ni abortos en animales en producción) para la prevención de las enfermedades Clostridiales y Pasteurelosis en bovinos, ovinos y caprinos.

INDICACIONES:

Indicado para la prevención de:

Carbunco sintomático (*Clostridium chauvoei*), Gangrena gaseosa (*Clostridium sordellii*), Edema maligno (*Clostridium septicum*).
Hepatitis necrótica infecciosa (*Clostridium novyi* tipo B) y Hemoglobinuria bacilar (*Clostridium haemolyticum*).
Enterotoxemia hemorrágica (*Clostridium perfringens* tipo D).
Neumonía (*Mannheimia haemolytica* y *P. multocida* tipo D).

DOSIS:
Vía subcutánea o intramuscular.

En Bovinos: Administrar 5 ml.
Ovinos y caprinos: Administrar 2 ml.

Primovacunación: aplicar 1 dosis y repetir a los 21-30 días. Revacunar anualmente.
En crías de madres no vacunadas comenzar la vacunación a los 15 días de vida.
En crías de madres vacunadas comenzar la vacunación a los 2 meses de vida.
En hembras gestantes la segunda dosis de la primovacunación o la única dosis de la revacunación anual deben administrarse 15 a 21 días antes del parto para una efectiva transferencia de anticuerpos calostrales.

- Resuspender la vacuna mediante agitación antes de aplicarse. Usar material estéril para su administración y aplicar estrictas medidas de asepsia.

PRECAUCIONES:

- La administración de inyectables en animales sensibles, puede provocar desde reacciones locales hasta anafilácticas. Si es el caso, tratar con epinefrina, antihistamínicos y corticosteroides.
- No administrar en animales enfermos, estresados o parasitados.
- Vacunar solamente animales sanos.
- CLOSTRISAN® P puede ser administrada simultáneamente con otros medicamentos veterinarios siempre que el equipo de la aplicación y el punto de inoculación sean diferentes. No mezclarlo con otros productos.
- Conservar entre 2 – 8°C. No congelar ni exponer a la luz directa del sol.
- Manténgase en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.
- Cualquier variación en el color del producto no afecta la estabilidad ni la eficacia del mismo.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

PERIODO DE RETIRO:

- No tiene.

PRESENTACIÓN:

Frasco x100 ml (20 dosis bovinas)

REGISTRO SANITARIO: 4A – 11074 – AGROCALIDAD

ELABORADO POR: VIRBAC URUGUAY
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA. LTDA.