DORAGAN®

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Doramectina 10 mL Excipientes c.s.p. 1 mL
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos, Ovinos y Porcinos.
INDICACIONES	Está indicado para el tratamiento y control de parasitosis internas y externas del ganado Bovino, Ovino y Porcino. **Bovinos** **Nemátodos gastrointestinales:** *Hamonchus placei, Ostertagia ostertagi, Trichostongylus axei, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus spp., Cooperia oncophora, Cooperia pectinata, Cooperia punctata, Trichostrongylus colubriformis, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus, Trichuris spp.* **Nemátodos pulmonares:** *Dyctiocaulus viviparus.* **Garrapatas:** Ayuda en el control de *Rhipicephalaus (Boophilos) microplus*. **Larvas productoras de nuche:** *Dermatobia hominis, Hypoderma bovis*. **Ácaros de la Sarna:** *Chorioptes bovis, Sarcoptes scabei, y Psoroptes sp.* **Piojos:** *Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus*. **Miasis:** Gusaneras – *Cochliomya hominivorax.* **Piojos masticadores** como *Bovicola bovis* y la **Mosca de los *cuernos*** *Haematobia irritans.* **Ovinos** **Nemátodos gastrointestinales:** *Haemonchus contortus, y Teladorsagia circumcincta, Trychostrongilus axei, Trichostrongylus colubriformis, Trichosntrongylus vitrinus, Chabertia spp., Cooperia oncophora, Nematodirus spp., Trichuris spp.* **Nemátodo pulmonar:** *Dyctiocaulus viviparus.* **Ácaros***: Psoroptes ovis.* **Miasis (gusaneras):** *Cochliomyia hominivorax* (gusano de la cabeza), *Oestrus ovis.* **Porcinos:** **Nemátodos gastrointestinales:** *Hyostrongylus rubidus, Strongyloides ransomi, Ascaris suum, Oesophagostomum dentatum, Trichuris suis.* **Nemátodo pulmonar:** *Metastrongylus spp.* **Nemátodo renal:** *Stephanurus dentatus.* **Ácaros de la sarna:** *Sarcoptes scabiei.*
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	**Bovinos y Ovinos:** Inyectar por vía subcutánea o intramuscular 200 µg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 mL/50 Kg de peso vivo. **Porcinos:** Inyectar por vía intramuscular 300 µg/Kg de peso vivo, en la práctica 1 mL/33 Kg de peso vivo.
TIEMPO DE RETIRO	**Bovinos y Ovinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 35 días después de finalizado el tratamiento.** **Porcinos: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 28 días después de finalizado el tratamiento.**

PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar. Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
PRESENTACION	Frascos por 500 mL
REGISTRO ICA	**6851 MV**