FINIQUITAR® 500 SC

INFORMACIÓN GENERAL **DEL PRODUCTO**

Ingrediente activo: Iprodione 500 g/l
Registro ICA. 1223
Formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Uso: Fungicida de uso agrícola
FRAC: E3

MODO DE **ACCIÓN**

Es un fungicida de contacto, perteneciente al grupo de las Dicarboxamidas, utilizado para el control de enfermedades originadas por hongos, puede ser utilizado como fungicida en postcosecha y como tratamiento de semillas

COMPATIBILIDAD

No es compatibles con productos de reacción alcalina. No tiene acción corrosiva sobre los equipos de aplicación..

CATEGORIA TÓXICOLOGICA: **II- MODERADAMENTE PELIGROSO**

METODO **DE EMPLEO**

Rociar las plantas usando el equipo de aspersión convencional. Para la preparación disuelva completamente la cantidad de **FINIQUITAR 500 SC** a usar en el tanque de mezcla, que contenga agua hasta ¾ o la mitad; complete el volumen de agua y agite hasta que la mezcla sea homogénea. Agite la mezcla permanentemente. Recuerde calibrar permanentemente el equipo de aspersión y verificar sus boquillas.

FRECUENCIA **Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Para un buen control con **FINIQUITAR 500 SC**, en papa, se debe realizar dos aplicaciones con intervalos de 7 días en presencia de la enfermedad. Se recomienda no aplicar en horas de calor ni con follaje humedecido. En Papa, se utiliza la dosis baja en condiciones de baja presión de la enfermedad, y la dosis alta cuando se presenten niveles de infestación alta o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad. En tomate, se debe iniciar la aplicación en los primeros signos de la enfermedad. Se realiza máximo dos aplicaciones consecutivas por ciclo de cultivo. En Crisantemo, iniciar las aplicaciones con los primeros signos de la enfermedad, teniendo en cuenta el producto se recomienda aplicar de acuerdo a la presión de la enfermedad. FINIQUITAR 500 SC, debe incluirse dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de mecanismo y modo de acción diferente.

RECOMENDACIONES **BÁSICAS**

Leer la etiqueta antes de usar el producto, siga las instrucciones y recomendaciones. Utilice ropa adecuada: Pantalón largo, camisa manga larga, botas, guantes, mascarilla y protector de ojos. No aplique el producto en dirección contraria al viento. No utilice la boca para destapar boquillas. No lave equipos en fuentes de agua. No utilice envases de agroquímicos para uso doméstico. Realice el triple lavado en envases para líquidos.

PRESENTACIONES

250 CC , 1Lt

RECOMENDACIONES **DE USO Y DOSIS**

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CULTIVO	PLAGA		Dosis	PC (días)	PR (horas)
	Nombre común	Nombre técnico			
Papa	Tizón temprano	*Alternaria solani*	*400-500 cc/Ha*	*7*	*4*
Tomate			*800 cc/Ha*	*7*	
Crisantemo	Moho Gris	*Botrytis cinerea*	*1 L/Ha*	*NA*	

P.C: Período de carencia. Días transcurridos entre la última aplicación y la cosecha.

P.R: Período de reentrada. Periodo de tiempo para el reingreso del personal al área tratada.

N.A.: No aplica.