FICHA TECNICA
VACUNA HEXAGAN.

Uso terapéutico: BIOLOGICO
Principio Activo: CLOSTRIDIUM, PASTEURELLA
Especies: Bovinos, Ovinos



Descripcion:

HEXAGAN *es una vacuna para bovinos y ovinos*

Composición
Clostridium chauvoie
Clostridium septicum
Clostridium haemolyticum
Clostridium novyi
Clostridium perfringens
Pasteurella multocida

- ***ACCIÓN****: Biológico*

- ***INDICACIONES:*** *Vacuna para la inmunización activa de bovinos sanos y ovinos sanos contra Carbón Sintomático, Edema Maligno o Gangrena Gaseosa y Pasteurelosis Bovina; así como la inmunidad pasiva de bovinos recién nacidos a través del calostro contra las infecciones clostridiales, es decir Clostridiumchauvoei, Clostridiumsepticum, Clostridiumhaemolyticum, Clostridiumperfringens, Clostridiumnovyiy adsorbidos en gel de Hidróxido de Aluminio*

- ***DOSIS:****Aplicar 5 mL por vía subcutánea en la tabla del cuello o en la región pre o pos escapular (antes o después de la paleta). El frasco de vacuna debe agitarse suavemente antes de extraer la dosis correspondiente de vacuna.*

-
- ***ESQUEMA DE VACUNACIÓN:*** *a. Primera dosis (animales primovacunados) entre los 3 y 4 meses de edad, y repetir la vacunación a las dos semanas (refuerzo), después de este esquema aplicar un refuerzo anual. b. Para animales de 6 meses o más que no se tenga conocimiento de vacunaciones anteriores, es recomendable comenzar con el esquema de vacunación indicado.*

c. Para estimular la inmunización pasiva de terneros a través del calostro contra las infecciones clostridiales: realizar vacunación de madres gestantes con una única dosis de refuerzo entre 8 y 2 semanas antes del parto, siempre que los animales hayan recibido un ciclo completo de vacunación primaria antes de la gestación.

- ***TIEMPO DE RETIRO:*** *No aplicar en animales destinados a consumo humano inmediato*
- ***CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES:*** *Como sucede en cualquier vacunación de animales, pueden presentarse reacciones de hipersensibilidadpor lo que se recomienda un tratamiento de soporte apropiado: Debe administrarse inmediatamente un tratamiento a base de clorhidrato de Difenhidramina (ALERVEC®) y si es el caso FLUNIXINA (FlunixinoMeglumínico) y broncodilatadores tipo AMINOFILINA. La administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar bajo la aprobación y supervisión del Médico Veterinario. No vacunar animales enfermos o inmunodeprimidos.*

  Dependiendo de la raza y estado sanitario, algunos animales vacunados con HEXAGAN® pueden presentar reacciones locales pasajeras a la vacuna. Estas reacciones suelen ser habitualmente inflamación leve en el sitio de aplicación, pero también pueden incluir hipertermia y dolor moderados, que deben desaparecer sin ningún tratamiento a los pocos días post aplicación, siempre y cuando se usen agujas limpias y equipo de vacunación adecuadamente esterilizado. Las reacciones locales son pasajeras y no afectan la salud general, conducta, nutrición o ganancia de peso de los animales vacunados, así como la eficacia de la vacuna.

- ***MODO DE APLICACIÓN:*** *Bacterina Inyectable.*
- ***PRESENTACIÓN:*** *Frascos por 20 y 50 dosis.*
- ***REGISTRO:*** *1437 DB*