IVERMECTINA 3.15%

COMPOSICIÓN	Cada mL contiene: Ivermectina 31.5 mg Excipientes c.s.p. 1 mL
ESPECIES DE DESTINO	Bovinos
INDICACIONES	En Bovinos con acción prolongada para el tratamiento y control del parasitismo interno y externo producido por: **Nemátodos gastrointestinales: Controla hasta 42 días** *Ostertagia ostertagi., Haemonchus placei., Trichostrongylus axei, Cooperia ocophora., Cooperia punctata, Cooperia surbanada, Cooperia spp., Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum.* **Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus.* **Ectoparásitos: Piojos:** *Lignonathus vituli, Solenopotes capillatus, Haematopinus eurysternus, Damalinia bovis.* **Ácaros: Controla hasta 56 días** *Psoroptes communis var bovis, Sarcoptes scabiei var bovis, Chorioptes bovis.* **Nuche:** *Dermatobia hominis.* **Ayuda en el control de la garrapata** *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* **hasta 75 días. Miasis: Controla hasta 140 días** *Cochliomyia hominivorax.*
DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN	**Bovinos:** 1 mL/50 Kg de peso vivo. Se administra únicamente por vía subcutánea.
TIEMPO DE RETIRO	**Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento. No administrar en bovinos destinados para producción de leche, ni 122 días antes del parto.**
PRECAUCIONES Y ALMACENAMIENTO	No debe aplicarse por vía intramuscular o intravenosa. No aplicar en animales lactantes. No aplicar en animales gestantes próximas a la parición. No usar en animales menores de 4 meses de edad. No aplicar en animales con fiebre o estado de desnutrición grave. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Venta bajo fórmula del Medico Veterinario. Almacena a temperatura inferior a 30°C y protegido de la luz solar.
PRESENTACION	Frascos por 50 mL, 100 mL, 250 mL y 500 mL.
REGISTRO ICA	**6196 MV**