# Master LP

Uso Veterinario

Reg.: ICA nº 7560 MV
Solución Inyectable
Endectocida de amplio espectro y acción prolongada.

## Composición:

Cada 100,00 mL contiene:
Ivermectina ..... 4,00 g
Excipientes c.s.p. .....100,00 mL

## Indicación:

En bovinos para el tratamiento y control de:

**Endoparásitos:**
**Parásitos gastrointestinales:** *Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Mecistocirrus digitatus, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Strongyloides papillosus, Toxocara vitulorum.*
**Parásitos pulmonares:** *Dictyocaulus viviparus*.
**Otros nematodos:** *Parafilaria bovicola, Thelazia* sp.
**Ectoparásitos:**
**Nuches:** *Dermatobia hominis, Hypoderma* sp.
**Ácaros:** *Psoroptes communis* var *bovis*, ayuda en el control de *Sarcoptes scabiei* var *bovis* y *Chorioptes bovis*.
**Piojos chupadores:** *Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus* y *Solenoptes capillatus*.
**Piojos masticadores:** Ayuda en el control de *Damalinia bovis*.
**Garrapatas:** Ayuda en el control de *Riphicephalus (Boophilus) microplus*.
**Miasis:** Ayuda en el control de larvas de *Cochliomyia hominivorax*.

**Master LP** tiene acción prolongada contra: *Trichostrongylus* sp, *Oesophagostomum* sp, *Dermatobia hominis*, *Ostertagia* sp y *Haemonchus placei*.

## Modo de uso y dosificación:

Aplicar por vía subcutánea, 1,0 mL para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabla abajo:

| Peso (kg) | Dosificación (mL) |
|---|---|
| 50 kg | 1,0 mL |
| 100 kg | 2,0 mL |
| 200 kg | 4,0 mL |
| 300 kg | 6,0 mL |
| 400 kg | 8,0 mL |
| 500 kg | 10,0 mL |
| **1 mL a cada 50 kg** | |

**Dosificación equivalente por kg**

**de peso corporal:** 800 µg de Ivermectina.

## Precauciones:

Obedecer a las dosificaciones recomendadas para el uso del producto.
No contaminar corrientes ni depósitos de agua con residuos del producto o sus envases, porque es tóxico para los peces y la vida acuática.
Los residuos del producto y sus envases deben ser dispuestos de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
Desechar el remanente del producto luego de transcurridos 06 (seis) meses de la primera toma.
No administrar en hembras gestantes 140 días previo al parto.

## Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No administrar el producto por vía intravenosa.
No utilizar medicamentos con el plazo de validez vencido.
No utilizar en animales que presenten hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del producto.

## Reacciones adversas:

El producto no presenta reacciones adversas cuando es administrado dentro de las recomendaciones indicadas.

## Tiempo de retiro:

**Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 133 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a vacas en producción de leche destinada al consumo humano.**

## Condiciones de almacenamiento y conservación:

Conservar el producto en el embalaje original, en lugar seco y fresco, en temperatura ambiente, entre 15ºC y 30ºC, y protegido de la luz solar directa y animales domésticos.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES DOMÉSTICOS Y PERSONAS DISCAPACITADAS.**
**VENTA BAJO FÓRMULA DEL MÉDICO VETERINARIO.**
**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

**Responsable Técnica:**
Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508

**Importado por:**
**Colombia:** Reg. ICA 7560-MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429

**Manufacturado por:**
**Ourofino Saúde Animal Ltda.**
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

5000359b/ 0220 OF00

ourofino
salud animal