

MAXIPASTO



Ficha técnica

Referencia	Fertilizante Foliar 12 – 10 – 10
------------	----------------------------------

Uso del producto

Uso exclusivo en cultivo de forrajes	Brachiarias, Panicum, Dichanthium, Penisetum, Cynodon, Patos de corte y gramas ornamentales en general.
--------------------------------------	---

Composición del producto

Composición y descripción del producto

Garantizado registro ICA	g/L	% p/p
Nitrógeno Total (N)	120,0	9,23%
Nitrógeno Amoniacal (N)	25,0	1,92%
Nitrógeno Nítrico (N)	25,0	1,92%
Nitrógeno Uréico (N)	70,0	5,38%
Fósforo Asimilable (P ₂ O ₅)	100,0	7,69%
Potasio Soluble (K ₂ O)	100,0	7,69%
Calcio (CaO)	5,0	0,38%
Magnesio (MgO)	5,0	0,38%
Azufre Total (S)	6,0	0,46%
Boro (B)	1,0	0,08%
Cobre (Cu)	0,0	0,00%
Hierro (Fe)	0,0	0,00%
Molibdeno (Mo)	0,0	0,00%
Zinc (Zn)	2,0	0,15%

Complemento Fuera de registro	g/L	% p/p
Aminiacido especificos	50,0	3,85%
Alga Ascophillum Nodosum	20,0	1,54%
Citoquininas (10 ppm)	0,01	0,001%
Giberilinas (30 ppm)	0,03	0,002%

Presentaciones

Contenedor Plástico	1 Litro - 1 Galón – 20 Litros
---------------------	-------------------------------

Dosis recomendada

Aplicación Mantenimiento	1 litro por 200 lt agua / 1 litro por Hectárea / 5cc por lt
Aplicación Potencializada ***	1,5 litros por 200 lt (2 aplicaciones) / 7,5 cc / lt

Forma de aplicación

Mantenimiento	8 a 12 días después de la salida del ganado
Potencializada (2 aplicaciones)	1ª aplicación 8 a 12 días / 1, 5 lt por hectárea 2ª aplicación de 20 a 25 días / 1 lt por hectárea
Nota: ***	"Aplicación Potencializada" después de estrés hídrico, estrés por sequía, ataque de plagas o enfermedades.

Datos técnicos y tecnológicos

	1. Doble Quelatación (Chelakel + EDTA)
--	--

NUTREX 3	2. MMF (Modificador Metabólico de Forraje)
	3. Nutrición por Extracción
Descripción	- Fertilizante foliar, complemento ideal para un sistema integrado en nutrición de pastos. - De alta tecnología para la nutrición de sus pastos. Su aliado perfecto, donde gana su pradera, su ganado y usted. Amigable con el medio ambiente, en beneficio de su producción de carne y/o leche. - Permite tener una pradera más palatable, más digestible, más productiva y de alto contenido nutricional
Generalidades	
Conservación	Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la radiación solar directa.
Mezclas	Se puede mezclar con insecticidas o fungicidas. Con herbicidas selectivos se recomienda con dosis reducidas a razón de 50 cm por bomba de 20lt. NO SE RECOMIENDA con herbicidas no selectivos tipo glifosato.