

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Chlorfenapyr

Concentración: 240 g / l

Grupo químico: Pirroles

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Actúa como insecticida y acaricida	* Disminución de costos en aplicación
Grupo químico pirroles	* Disminuye la probabilidad de resistencia, excelente alternativa de rotación
Efecto contundente	* Rápido control

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CLAVEL	Ácaros (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0.3 - 0.4 ml / l	12 Horas	N.A.
FRÍJOL	Trips (<i>Trips palmi</i>)	0.4 - 0.5 ml / l	Cuando se seque el follaje	7 Días
POMPÓN	Ácaros (<i>Tetranychus urticae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Minador (<i>Liriomyza sp.</i>)	0.4 - 0.6 ml / l	12 Horas	N.A.
TOMATE	Gusano cogollero (<i>Tuta absoluta</i>)	0.5 - 0.6 ml / l	Cuando se seque el follaje	7 Días

MODO DE ACCIÓN

Acaricida e insecticida que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN

Inhibe el proceso energético de la fosforilación.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A: No aplica.

PRESENTACIONES 100 mililitros y 1 litro

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



DAÑO



Registro Nacional ICA No. 289

DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO
www.agroactivocol.com