

FICHA TÉCNICA

SIDERAL 70 SL



Fecha de actualización: 12-06-2026

Fungicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Concentrado Soluble (SL)
Ingrediente activo: Propamocarb HCl
Concentración: 700 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Carbamato

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico, preventivo y curativo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Afecta la permeabilidad de la membrana celular.

Clasificación FRAC: F428

USOS

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS)	PERÍODO DE REENTRADA (HORAS)
Aguacate <i>Persea americana</i>	Pudrición de raíz <i>Phytophthora cinnamomi</i>	5 cc/L	N.A.	4
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildeo veloso <i>Peronospora destructor</i>	2.5 cc/L	14	4
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Gota o tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 cc/L	14	4
Rosa <i>Rosa sp</i>	Mildeo veloso <i>Peronospora sparsa</i>	1.5 cc/L	N.A.	4
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gota o tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 cc/L	14	4

Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido. El valor PR contenido en la presente etiqueta fue calculado por evaluación del riesgo (método 2. Res. ICA 00011768)

Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A.: No Aplica

Propiedades fisicoquímicas relevantes

pH: 3.8 a 20 °C

Densidad: 1.0 g/cm³ a 20 °C

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

FICHA TÉCNICA

SIDERAL 70 SL



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar SIDERAL 70 SL a las dosis recomendadas y dentro de un programa de rotación técnica de productos y siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El producto se puede aplicar con equipos convencionales de uso común en las fincas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial especialmente cuando se aplique sobre variedades nuevas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

RESTRICCIONES DE USO

No usar cerca a fuentes de agua. Respete las franjas de seguridad que deben existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección (fuentes de agua, zonas apícolas, áreas pobladas, etc.)

No aplicar sin el uso de equipos de protección personal (EPP).

CONDICIONES DE LMACENAMIENTO

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 30 °C.

Almacenar en un lugar exclusivo para este fin, bajo llave y con restricciones de acceso.

PRESENTACIONES: 1, 4, 20 Litros

Vida útil (shelf life): 24 meses

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO 2886012**



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**



Registro Nacional ICA No. PL0003142022

**Formulado, Distribuido y Comercializado por:
QUIMICOS OMA S.A.**

Autopista Medellín Km 2.5 Vía Parcelas (Cota) Km 1.3

Parque Empresarial AEPI, Bodega 16

PBX: 8985179 – E. Mail: servicioalcliente@quimicosoma.com

Cota (Cundinamarca), Colombia

www.quimicosoma.com