

FICHA TÉCNICA

SKEL 250 EC



Fecha de actualización: 12-06-2026

Fungicida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Concentrado emulsionable EC
Ingrediente activo: Difenoconazol
Concentración: 250 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Triazoles

MODO DE ACCIÓN: Fungicida sistémico, con actividad preventiva y curativa

MECANISMO DE ACCIÓN: Afecta la enzima C14-demetilasa en la biosíntesis de esteroides en las membranas de los hongos.

Clasificación FRAC: G1-3

USOS

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C
CEBOLLA (Bulbo)	Alternaria (<i>Alternaria porri</i>)	100 ml/ 200 L	4 horas	7 -14 días
CLAVEL	Mancha foliar anillada: Cladosporium (<i>Heterosporium echinulatum</i>)	0,6 ml/ L	4 horas	N.A.
FRIJOL	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	166 ml / 200 L	4 horas	14 días
ROSAS	Mildeo polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0,6 ml/L	4 horas	N.A.
TOMATE	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	100 ml/200 L	4 horas	7 días

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A.: No aplica

Propiedades fisicoquímicas relevantes

pH: 5.8 a 20 °C

Densidad: 1.0 g/cm³ a 20 °C

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

FICHA TÉCNICA

SKEL 250 EC

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar SKEL 250 EC a las dosis recomendadas y dentro de un programa de rotación técnica de productos y siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El producto se puede aplicar con equipos convencionales de uso común en las fincas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial especialmente cuando se aplique sobre variedades nuevas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

RESTRICCIONES DE USO

No usar cerca a fuentes de agua. Respete las franjas de seguridad que deben existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección (fuentes de agua, zonas apícolas, áreas pobladas, etc.)

No aplicar sin el uso de equipos de protección personal (EPP).

CONDICIONES DE LMACENAMIENTO

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 30 °C.

Almacenar en un lugar exclusivo para este fin, bajo llave y con restricciones de acceso.

PRESENTACIONES: 100, 250 mililitros; 1 y 20 Litros

Vida útil (shelf life): 24 meses

