

FICHA TÉCNICA

TUMBADOR 250 SC

TUMBADOR[®]

250 SC

Fecha de actualización: 12-06-2026

Insecticida de uso agrícola
Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)
Ingrediente activo: Ciromazina + Lamdacihalotrina
Concentración: 200 g/L + 50 g/L
Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro
Grupo químico: Triazina + Piretroide

MODO DE ACCIÓN: Insecticida traslaminar que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Acción nerviosa como modulador del canal de sodio y Regulación del crecimiento como disruptor de muda (dípteros).

Clasificación IRAC: 3A + 17

USOS

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PERÍODO DE CARENCIA (DÍAS)	PERÍODO DE REENTRADA (HORAS)
Arveja <i>Pisum sativum</i>	Minador del tallo <i>Liriomyza trifolii</i>	450 cc/ha	15	4
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Minador <i>Liriomyza huidobrensis</i>	750 cc/ha	14	4
Fríjol <i>Phaseolus vulgaris</i>	Minador <i>Liriomyza huidobrensis</i>	450 cc/ha	15	4
Melón <i>Cucumis melo</i>	Minador <i>Liriomyza trifolii</i>	120 cc/200 L	3	4
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Minador <i>Liriomyza quadrata</i>	450 cc/ha	14	4
Pompón <i>Chrysanthemum spp</i>	Minador <i>Liriomyza trifolii</i>	0.75 cc/L	N.A.	4
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Minador <i>Liriomyza trifolii</i>	450 cc/ha	5	4

Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A. No Aplica

Propiedades fisicoquímicas relevantes

pH: 7.3 a 20 °C

Densidad: 1.0 g/cm³ a 20 °C

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

FICHA TÉCNICA

TUMBADOR 250 SC

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar TUMBADOR 250 SC a las dosis recomendadas y dentro de un programa de rotación técnica de productos y siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El producto se puede aplicar con equipos convencionales de uso común en las fincas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial especialmente cuando se aplique sobre variedades nuevas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

RESTRICCIONES DE USO

No usar cerca a fuentes de agua. Respete las franjas de seguridad que deben existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección (fuentes de agua, zonas apícolas, áreas pobladas, etc.)

No aplicar sin el uso de equipos de protección personal (EPP).

CONDICIONES DE LMACENAMIENTO

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 30 °C.

Almacenar en un lugar exclusivo para este fin, bajo llave y con restricciones de acceso.

PRESENTACIONES: 100 mililitros, 1 Litro

Vida útil (shelf life): 24 meses

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 018000916012 FUERA DE BOGOTÁ
EN BOGOTÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 2886012**

