

## FICHA TECNICA

# Volley®

fenpropimorf

Fungicida / Líquido miscible

### “COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

Ingrediente activo	% en peso
<b>Fenpropimorf:</b> <i>cis</i> -4-[( <i>RS</i> )-3-(4- <i>tert</i> -butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolina.....	94.62 %
(Equivalente a 880 g de i.a./L a 20°C)	
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Isómeros e impurezas.....	5.38 %
<b>Total.....</b>	<b>100.00 %</b>

REG.RSCO-FUNG-313-301-203-94.62

**Titular del registro, importado y distribuido en México por: BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.**  
AV. INSURGENTES SUR 975  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES  
C.P. 03710 CIUDAD DE MÉXICO.  
TEL. 01 (55) 5325-2600

## INSTRUCCIONES DE USO

**Volley®** es un fungicida sistémico que tiene actividad preventiva, curativa y actúa como protectante. Su medio de absorción es foliar y su mecanismo de acción reside en la inhibición de la germinación de las esporas del hongo.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Plátano ( 0 )	<b>Sigatoka Negra</b> <i>Mycosphaerella fijiensis</i>	0.7	Aplicación al follaje. Iniciar aplicaciones de forma preventiva o bien cuando las condiciones climatológicas sean propicias para el desarrollo de la enfermedad.

**( ) = Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.**

**Tiempo de reentrada a los lugares tratados:** Cuando el producto haya secado.

### Métodos para preparar y aplicar el producto.

Vaciar agua al tanque de aspersión hasta la mitad de su capacidad, añadir **Volley®** con el sistema de agitación en marcha.

**En aplicaciones terrestres:** El volumen de agua debe ser de 200-400 L/ha.

Para lograr un mejor desempeño del fungicida recomendamos trabajar a presión constante y mantener uniforme la salida de la mezcla durante toda la aplicación (las boquillas o el atomizador de rotación deben funcionar con perfección).

### Preparación de la mezcla:

**Emulsiones:** 1.- Colocar en el tanque de la mezcla el volumen deseado de aceite por hectárea para la emulsión. 2.- Adicionar el emulsificante no iónico al 1% del volumen de aceite utilizado. 3.- Agitar por 3 minutos. 4.- Agregue el 50 % del volumen de agua a utilizar. 5.- Agitar por 3 minutos. 6.- Adicionar el **Volley®** a la dosis indicada. 7.- Agitar por 3 minutos. 8.- Completar el volumen de agua restante. 9.- Agitar el total de la mezcla por 10 minutos.

**Suspensiones:** 1.- Colocar en el tanque de la mezcla el volumen deseado de aceite por hectárea para la suspensión. 2.- Adicionar el **Volley®** a la dosis indicada. 3.- Agitar por 3 minutos. 4.- Agitar el total de la mezcla por 5 minutos.

### Contraindicaciones:

No aplicar cuando existan fuertes corrientes de aire (más de 15 km/h), ni cuando exista temperatura alta (más de 28°C). Las aplicaciones deben realizarse de preferencia por la mañana o por la tarde. **Volley®** no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se usa de acuerdo con las recomendaciones de uso.

### Incompatibilidad:

De acuerdo con los resultados de estudio de compatibilidad en mezclas de tanque; **Volley®** puede mezclarse con aceite mineral.

### “Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACION; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDOLO CON OTROS GRUPOS QUIMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACION Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS METODOS DE CONTROL”.