

FICHA TÉCNICA

ZOOM 650 SC



Fecha de actualización: 12-06-2026

Fungicida de uso agrícola

Titular: QUÍMICOS OMA S.A.

Tipo de formulación: Suspensión Concentrada (SC)

Ingrediente activo: Dimetomorph + Propamocarb HCl

Concentración: 300 g/L + 350 g/L

Ingredientes aditivos: c.s.p. 1 litro.

Grupo químico: Morfolinas + Carbamatos

MODO DE ACCIÓN: Fungicida Sistémico. Preventivo y Curativo.

MECANISMO DE ACCIÓN: Afecta la biosíntesis de la pared celular (celulosa sintasa) y la integridad de la membrana.

Clasificación FRAC: H5-40 + F4-28

USOS

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	P.R.
Cebolla (bulbo)	Mildeo Velloso <i>Peronospora destructor</i>	400 cc / 200 L	7 días	4 horas
Papa	Gota o tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	400 cc / 200 L	7 días	4 horas
Piña	Podredumbre del corazón <i>Phytophthora parasitica</i>	3 cc / L	90 días	24 horas
Rosa	Mildeo velloso <i>Peronospora sparsa</i>	1.25 cc /L	N.A.	4 horas
Tomate	Gota o tizón tardío <i>Phytophthora infestans</i>	400 cc / 200 L	7 días	4 horas
Uva	Mildeo Velloso <i>Plasmophara viticola</i>	1.5 cc/L	7 días	4 horas

P.R.: Periodo de Reentrada (Reingreso): Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del plaguicida y el ingreso de personas y animales al área o cultivo tratado sin elementos de protección personal. Las personas no podrán ingresar al área de cultivo dentro del tiempo establecido.

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

N.A.: No Aplica

FICHA TÉCNICA

ZOOM 650 SC

Propiedades fisicoquímicas relevantes

pH: 5.8 a 20 °C

Densidad: 1.3 g/cm³ a 20 °C

Consulte la Ficha de Datos de Seguridad (FDS)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar ZOOM 650 SC a las dosis recomendadas y dentro de un programa de rotación técnica de productos y siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

El producto se puede aplicar con equipos convencionales de uso común en las fincas.

COMPATIBILIDAD

Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial especialmente cuando se aplique sobre variedades nuevas.

FITOTOXICIDAD: No se ha presentado fitotoxicidad en los cultivos de la recomendación de uso. Sin embargo, se recomienda hacer pruebas previas a su uso comercial.

RESTRICCIONES DE USO

No usar cerca a fuentes de agua. Respete las franjas de seguridad que deben existir entre el sitio de aplicación y el lugar que requiere protección (fuentes de agua, zonas apícolas, áreas pobladas, etc.)

No aplicar sin el uso de equipos de protección personal (EPP).

CONDICIONES DE LMACENAMIENTO

Almacenar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, alejado de alimentos y medicinas para uso humano y veterinario, bajo condiciones que garanticen su conservación.

Almacenar a temperatura ambiente no superior a 30 °C.

Almacenar en un lugar exclusivo para este fin, bajo llave y con restricciones de acceso.

PRESENTACIONES: 200 cc, 1, 4, 20 Litros

Vida útil (shelf life): 24 meses



FICHA TÉCNICA ZOOM 650 SC
