

Gránulos dispersables en agua

Fungicida

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 0214

Actualización: 09 de octubre de 2018

F

Aguila® WG

AGUILA® WG es un fungicida orgánico del grupo EBDC's (ditiocarbamatos) con amplio espectro de acción para el manejo preventivo de diferentes enfermedades. AGUILA® WG posee una novedosa formulación WG con 50% de sus microgránulos menores de 2.15 micras lo que le permite una dispersión instantánea en agua. AGUILA2® WG contiene 14% de zinc, micronutriente esencial para el crecimiento de las plantas.

La formulación de este producto aporta cantidades importantes de silicio que fortalece la pared celular del cultivo, del ataque de patógenos.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Metiram 700 g/Kg (70%).

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Tratamiento de semillas**Fungicida — Insecticida**

Uso agrícola

Reg. Nal. ICA 1770

Actualización: 09 de octubre de 2018**RECOMENDACIONES DE USO:**

CULTIVO	Enfermedad/Plaga	Dosis Producto Comercial cc PC/100 Kg	PR*	PC**
Arroz	Complejo del manchado del grano <i>Helminthosporium sp</i> <i>Cercospora oryzae</i> <i>Sarocladium oryzae</i> <i>Rhynchosporium oryzae</i>	2.4 kg/ha Aplicar al inicio de la floración (entre 20% y 30% de espigamiento emergido)	4 horas	15 días
Banano	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	2.0 kg/ha Aplicar de manera preventiva con infestaciones muy bajas, tanto en emulsión convencional como en suspensión	4 horas***	7 días
Cebolla de bulbo, Cebolla larga, Cebollín, Cebollín chino, Puerro	Cenicilla (<i>Peronospora destructor</i>)	1.5 kg/ha	4 horas	7 días
Fresa, Arandano alto, Arandano ojo de conejo, Arandano cranberry, frambuesa, Mora, Brevo, Uva	Antracnosis (<i>Colletotrichum sp</i>)	1.5 kg/ha	4 horas	7 días
Melón, Ahuyama, Pepino, Calabacín, Sandía	Mildeo (<i>Bremia lactucae</i>)	1.5 a 2.0 kg/ha	4 horas	7 días
Lechuga	Mildeo (<i>Bremia lactucae</i>)	1.5 kg/ha	4 horas	7 días
Papa	Gota, gotera o Lancha (<i>Phytophthora infestans</i>)	400 a 550 g/200 L de agua	4 horas	14 días
Repollo, Coliflor, Brócoli, Tatsoi, Tatsoi 1, Repollo de Bruselas	Mildeos (<i>Peronospora sp.</i>)	1.5 kg/ha	4 horas	7 días
Tomate, Uchuva, Lulo, Tomate de árbol, Ají, Pimentón, Berenjena, Ají dulce	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	1.5 a 2.0 kg/ha	4 horas	7 días
Plátano	Sigatoka negra (<i>Mycosphaerella fijiensis</i>)	1.4 kg/ha	4 horas***	7 días
Clavel (Ornamentales)	Mancha anillada: <i>Cladosporium echinulatum</i> (<i>Heterosporium echinulatum</i>)	1.5 a 2.0 g/L de Agua	4 horas***	N/A

PR*: Periodo de reentrada, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la entrada de personal al área tratada.

PC**: Periodo de carencia, intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha.



COMPATIBILIDAD

AGUILA® WG es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas utilizados corrientemente, excepto los de reacción fuertemente alcalina. En caso de duda, efectuar prueba previa antes del tratamiento.

ADVERTENCIA

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en el envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PRESENTACIÓN: Bolsa plástica por 800 g y 10 Kg.

PRECAUCIONES:

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado, en lugar fresco y aireado, lejos de alimentos, drogas y forrajes y animales domésticos, y nunca en el mismo lugar donde se duerme, come o preparan los alimentos.

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar polvo, vapor o aspersión.
- Evite contacto con la piel y la ropa.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.



PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.

Por ingestión: NO PROVOCAR el vómito.

Por inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y aireado; manténgalo en reposo y vigile la respiración.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

No dar de beber nada, ni inducir el vómito a un paciente que se encuentre inconsciente.

En caso de intoxicación llamar a CISPROQUIM. Teléfonos 01 8000 916012 o (1) 2886012 en Bogotá D.C. Servicio las 24 horas. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para contener alimento o agua para consumo. Rotulado Aprobado ICA: 06/09/2007.



PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine fuentes de agua, ríos o acequias con el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue el envase al programa Campo Limpio de manejo de envases