


# BÚFALO F1 Tomate Chonto



| Estados de Desarrollo |                    |                             |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|
| Días a germinación    | Días a Transplante | Días Inicio a cosecha (DDT) |
| 4 a 8                 | 22 a 30            | 75 a 85                     |

| Descripción del Fruto            |           |             |                     |                      |
|----------------------------------|-----------|-------------|---------------------|----------------------|
| Forma                            | Peso (g)  | Postcosecha | Color en maduración | Clase de crecimiento |
| Cuadrado con hombros redondeados | 130 - 185 | Excelente   | Rojo                | Indeterminado        |

| Adaptabilidad                                 |             |                                        |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Área fría moderada (1800 a 2200 msnm)         | 80 - 85 DDT | Densidad de siembra<br>15.000 a 25.000 |
| Área cafetera (1200 a 1800 msnm)              | 75 - 80 DDT |                                        |
| Valle geográfico del río Cauca: (0-1200 msnm) | 70 - 75 DDT |                                        |

## RESISTENCIAS/TOLERANCIAS

**V:** Verticillium wilt, **FF:** Fusarium wilt raza 1 Y 2, **N:** Root knot nematode, **T:** Tomato Mosaic Virus  
**Sw:** Tomato Spotted wilt, **Ty:** Tomato Yellow Leaf Curl Virus

## CARACTERÍSTICAS

Planta de crecimiento indeterminado, con buen vigor, excelente cobertura; frutos tipo santa clara, con excelente comportamiento en poscosecha, de buen tamaño desde el comienzo hasta el final de la cosecha.

## PRESENTACIÓN Sobre de 1.000 Semillas

La información contenida en este folleto, fue obtenida después de la realización de ensayos de campo. Los resultados pueden variar de acuerdo con la región, el clima, el sistema de siembra, etc.