

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <h1>GUINEA ZURI</h1>                          |
| Ficha técnica                                                                     |                                               |
| Referencia                                                                        | Pasto tropical                                |
| Nombre científico o latín                                                         | PANICUM MAXIMUM CV ZURI                       |
| Nombre común                                                                      | India o Guinea Zuri                           |
| Ciclo vegetativo                                                                  | Perenne                                       |
| Origen                                                                            | Este de África                                |
| Forma de crecimiento                                                              | Cespitoso (en matojos)                        |
| Establecimiento                                                                   | 90 a 120 días                                 |
| Presentación                                                                      |                                               |
| Bolsa                                                                             | 1 kg                                          |
| Información técnica                                                               |                                               |
| Altitud (msnm)                                                                    | 0 a 1,600 m                                   |
| Clima                                                                             | Cálido a templado                             |
| Datos de siembra                                                                  |                                               |
| Siembra                                                                           | Al voleo, a chuzo, mecanizado                 |
| Densidad de siembra (Ha)                                                          | 10 a 12 kg                                    |
| Fertilidad del suelo                                                              | Fertilidad Alta                               |
| Precipitación (mm)                                                                | Superior a 800 mm                             |
| Calidad de forraje                                                                |                                               |
| Proteína bruta en materia seca                                                    | 12 - 14%                                      |
| Digestibilidad                                                                    | Excelente                                     |
| Palatabilidad                                                                     | Excelente                                     |
| Tolerancia a la sequía                                                            | Alta                                          |
| Tolerancia al encharcamiento                                                      | Baja                                          |
| Tolerancia al salivazo                                                            | Alta                                          |
| Producción de forraje                                                             |                                               |
| Materia seca (Ton/Ha/Año)                                                         | 22 a 26                                       |
| Generalidades                                                                     |                                               |
| Ciclo de rotación                                                                 | Después del establecimiento, cada 30-45 días. |
| Mezclas                                                                           | Asociar con Guinea Mombasa.                   |
| Usos                                                                              | Pastoreo, ensilaje, henificación y corte.     |

Registro de importación ICA 5737  
 Todas las semillas son seleccionadas y fiscalizadas Todos  
 los lotes de semillas salen con pruebas de germinación.  
 Distribuido por **AGROACTIVO**  
[www.agroactivocol.com](http://www.agroactivocol.com)