



PECUARIA

CLIMA FRÍO



TETRABLEND® ITALIANO

MEZCLA

Buena rusticidad y alta producción de forraje comparada con otros Ryegrases Italianos del mercado.

Composición	Ryegrass Anual Diploide 1: 70% Ryegrass Anual Diploide 2: 15% Ryegrass Anual Diploide 3: 15%
Densidad de siembra	75 – 100 lb/ha
Adaptación (metros sobre el nivel del mar)	2200 – 3300 msnm
Días a germinación	5 – 7
Tiempo al primer pastoreo o corte en días (rango promedio) - Prefloración (antes de espigar) (*)	65 – 90
Tiempo de rotación en días (rango promedio) - Prefloración (antes de espigar) (*)	28 – 40
Rango de pH	5,0 – 8,0
Requerimiento promedio de agua. Precipitación o riego en milímetros/mes	90 – 100
Producción de forraje verde por corte o pastoreo en toneladas por hectárea (*)	18 – 26
Tolerancia a Roya (<i>Puccinia spp.</i>)	Media
Proteína Cruda (PC) (%) (*) (**)	16 – 20
Fibra en Detergente Neutro (FDN) (%) (*) (**)	45 – 53
Fibra en Detergente Ácido (FDA) (%) (*) (**)	25 – 35
Energía Neta de Lactancia (Mcal/kg) (*) (**)	1,2 – 1,3

(*) El tiempo al primer pastoreo o corte, los días a la cosecha, el tiempo de rotación o cortes, la producción y calidad nutricional del forraje, dependerán de las condiciones edafo-climáticas y de manejo (fertilización, riego, etc.).

(**) Rango promedio como porcentaje de la materia seca.

NOTA: La información contenida en esta ficha técnica, es producto de evaluaciones realizadas por Sáenz Fety S.A.S. y puede variar de acuerdo con las condiciones agroecológicas y/o de manejo propias de cada zona.