

INSECTICIDA SPIROMESIFEN OBERON SC 240

INSECTICIDA SPIROMESIFEN OBERON SC 240 es un moderno insecticida que debido a su novedoso mecanismo de acción, no presenta resistencia cruzada con otros insecticidas y acaricidas, ofreciendo un excelente control sobre huevos y ninfas tanto de mosca blanca como de ácaros.

Composición

Suspensión Concentrada Spiromesifen

Beneficios

- Actúa por contacto sobre todos los estados de desarrollo de la plaga, incluyendo los huevos, otorgando un alto control y asegurando una cosecha sana.
- No presenta resistencia cruzada con otros insecticidas y acaricidas, ofreciendo un excelente control simultáneo de mosca blanca y ácaros.

usos y modo de manejo

Cultivo	Plaga	Dosis L/Ha	1P.C.	2P.R.	
Algodón	Ácaro rojo-Araña roja Tetranychus urticae	0.5 L/Ha Aplicar al inicio de la infestación de la plaga, garantizar una adecuada aplicación y cobertura del follaje	21 días	12 horas	
	Mosca blanca Bemisia tabaci	0.6 L/Ha			
Arroz	Ácaro del arroz Steneotarsonemus spinki	0.4 L/Ha Aplicar al inicio de la infestación	15 días		
Habichuela	Mosca blanca Trialeurodes vaporariorum	0.4-0.6 L/Ha o 150 mL/200 L de agua	3 días		
Fresa	Ácaro rojo Tetranychus urticae	0.6 L/Ha o 100 mL/200 litros de agua.			
Mora					
Tomate	Mosca blanca Trialeurodes vaporariorum	0.4 - 0.6 L/Ha o 150 mL/200 L de agua			4 horas
Ají					
Lulo					
Pimentón					
Tomate de árbol	Mosca blanca Trialeurodes vaporariorum	0.4 - 0.6 L/Ha o 130-200 mL/200 L de agua	7 días	12 horas	
Papaya	Ácaro rojo, Araña roja Tetranychus urticae	0.5 L/Ha			

Aguacate	Arañita roja Oligonychus yothersi	0.5 L/Ha Aspersión foliar con niveles de la plaga no mayor a 10 individuos por hoja 300 - 500 L de agua /Ha	70*** días	
Café	Arañita roja Olygonichus yotjhersi	0.5 L/Ha Aspersión foliar con niveles de plaga no mayor a 5 individuo por hoja	35 días	
ORNAMENTALES++				
Clavel	Ácaro Tetranychus cinnabarinus	0.6 L/Ha o 0.5 mL/L agua volumen de aspersión 1200 L de agua/Ha	N.A.	4 horas