

FICHA TECNICA

BOTRINEX

TIPO		Fungicida de origen vegetal		
INGREDIENTE ACTIVO		Carvacrol, Timol, Citral		
GRUPO QUIMICO		Extracto vegetal		
CONCENTRACION Y FORMULACION		90% SL (Concentrado Soluble)		
MODO DE ACCION		Contacto, preventivo		
FABRICANTE FORMULADOR		BRACHEM SAS		
TOXICIDAD		GRUPO IV Ligeramente toxico		
		LD50 producto comercial: Oral: NO produjo efecto adverso observable (NOEL) a la dosis de 5.000 fi'ig/kg de peso vivo en ratas. Dermal: NO produjo efecto adverso Observable (NOEL) a la dosis de 5.000 mg/'kç de peso vivo en ratas.		
		Etiqueta con franja de color verde		
		Palabra : PRECAUCION		
ANTIDOTO		No existe antídoto específico.		
RECOMENDACIONES DE USO				
Cultivo	Problema	Dosis		Observaciones
		al suelo	al follaje	
Flores	Botritis (Botrytis sp) y mildeo polvoso (Sphaerateca pannosa)		7 cc/litro agua	7 cc por litro de agua cada cuatro (4) días, bajo condiciones de alta severidad y de un clima favorable para el patógeno. Como preventivo 4 cc por litro de agua, en el programa de rotación.
Hortalizas, Ornamentales, Frutales, Algodón	Botritis (Botrytis sp) y mildeo polvoso (Sphaeroteca pannosa)	2Lts/ha, 200cc/20Lts de agua o 2Lts/caneca de 55 gal	1Lt/ha, 100cc/20Lts de agua o 1Lt/Caneca de 55 gal	Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana en las últimas de la tarde. La dosis recomendada es preventiva cada 15 días y en aparición de los síntomas o para control se recomienda tres aplicaciones con frecuencia semanal con 10 cc por litro de agua (2 lts/caneca 200 lts).
PRINCIPALES CARACTERISTICAS		BOTRINEX es un fungicida botánico de amplio espectro Obtenido a partir extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que mezcla facilmente con agua, es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inocuo para el hombre y el medio ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, algodón y pantas ornamentales. Actúa como endoelictor y exoelictor por los rnetabolitos presentes en los extractos. Además algunos alteran el hábitat de los hongos.		
PREPARACION DE LA MEZCLA		Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de BOTRINEX y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.		
COMPATIBILIDAD		BOTRINEX es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física		