

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-055
PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 8
I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 8/May/2025

1. NOMBRE

Lindero® 200 EC Registro Nacional ICA No. PL0010062023

2. DESCRIPCIÓN

Lindero® 200 EC es un herbicida que tiene como ingrediente activo Fluroxypyr acido 200 g/L, equivalente a 288 g/L de Fluroxypyr meptyl.

3. CARACTERÍSTICAS

Lindero® 200 EC es un herbicida hormonal sistémico, derivado del ácido piridino carboxílico. Después de su aplicación, es rápidamente absorbido por las hojas y transportado a otras partes de la planta. Es selectivo a gramíneas, afectando el crecimiento por atrofia o malformación de los haces vasculares. Recomendado para el control de malezas tanto herbáceas, semileñosas y arbustivas en potreros

4. ESPECIFICACIONES

Densidad: 0,95 - 0,99 g/mL

Estabilidad de la mulsión: Estable según la NTC 292

Contenido de Fluroxypyr Meptyl: 273.6-302 g/L

5. APLICACIONES Y USOS

Se debe efectuar una aplicación en la etapa inicial de crecimiento de las malezas, bajo condiciones de buena humedad. Aplique Lindero® 200 EC cuando las malezas estén en activo crecimiento, es decir una vez establecido el periodo de lluvias o cuando exista suficiente humedad en el suelo.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-055
PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 8
I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 8/May/2025

CULTIVO	ARVENSES	DOSIS (L/ha)	LMR ⁽¹⁾ (mg/kg)	P.C. ⁽²⁾ Días	P.R. ⁽³⁾ Horas
POTREROS	Amor seco o Pega pega: (<i>Desmodium tortuosum</i>) Escoba negra: (<i>Sida acuta</i>) Escoba blanca: (<i>Sida rhombifolia</i>) Cotorrera: (<i>Croton argenteus</i>)	1,0			
TRATAMIENTO POR TOCONEO	Pepa burro o burra de fruto: (<i>Xilopia aromatica</i>) Limón: (<i>Citrus limon</i>) Karate, Manca de mula: (<i>Hydroles spinosa L.</i>) Bicho hembra: (<i>Senna occidentalis (L.) Link</i>) Olleto o Coco de mico: (<i>Lecythis minor</i>)	0,6 (Equivalente a 1% de LINDERO® 200 EC En un volumen de aplicación de 60 L de mezcla/ha)	N.A.	N.A.	0 ⁽⁴⁾

(1) LMR: Límite Máximo de Residuos: valores de referencia.

(2) P.C. (Periodo de Carencia): número de días entre la última aplicación y la cosecha: no aplica de acuerdo con la Res. No. 75487 de 2020 del ICA.

(3) P.R. (Periodo de Reentrada al área tratada): N.A., según Resolución 30058 del ICA.

(4) Para praderas: Tiempo de reingreso de animales a pastoreo en el área tratada: 1 día.

Mezclar la cantidad necesaria de Lindero® 200 EC con agua limpia en el tanque de la aspersora. Calibre el equipo de aspersión antes de la aplicación.

6. PRESENTACIÓN

Lindero® 200 EC se ofrece al mercado en las presentaciones de 1, 4 y 20 litros.

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA MANIPULACIÓN

Almacenamiento

Almacenar el Lindero® 200 EC bajo llave en un lugar fresco, seco y ventilado, en sus envases y empaques originales, debidamente cerrados y con su etiqueta adherida para evitar posibles deterioros y accidentes. No almacenar en casa de habitación ni almacenar o transportar cerca de alimentos para humanos y animales domésticos, fertilizantes, semillas y/o plaguicidas para evitar intoxicación y/o posteriores efectos en cultivos susceptibles a este tipo de herbicidas. Lindero® 200 EC tiene una fecha de vencimiento de 2 años.

Indicaciones de manejo

7.1 Lea la etiqueta antes de usar el producto.

7.2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

7.3 Utilizar siempre los elementos de protección personal (EPP) para la manipulación de este producto

7.4 Evite contaminar con Lindero® 200 EC las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano o para riego de cultivos.

7.5 En caso de contacto prolongado con la piel se pueden producir irritaciones. Cámbiese la

FICHA TÉCNICA	CÓDIGO: FT-P-A-055
PRODUCTO TERMINADO LINDERO 200 EC	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	VERSIÓN: 8
I+D AGROQUÍMICOS	FECHA: 8/May/2025

ropa y los zapatos contaminados, lávese con abundante agua y jabón la parte afectada.

7.6 Después de la aplicación, lávese la piel con abundante agua y jabón, lo mismo que la ropa antes de utilizarla de nuevo.

7.7 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos.

7.8 En caso de ingestión debe hacerse lavado gástrico y no inducir el vómito.

7.9 En caso de inhalación, trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado manteniéndola abrigada y en reposo.

7.10 Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

7.11 Lindero® 200 EC es un herbicida clasificado toxicológicamente como de CATEGORIA 4 LIGERAMENTE PELIGROSO.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

Durante la manipulación de Lindero® 200 EC se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo, uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del medio ambiente.

9. GARANTÍA

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que mediante registro oficial de venta , se verificó que es apto para los fines aquí recomendados, de acuerdo a las indicaciones de empleo.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Cargo: Profesional Tecnológico II Agroquímicos Fecha: 07/May/2025	Cargo: Gerente Centro Tecnológico Fecha: 07/May/2025	Cargo: Sistema De Gestión Integral Fecha: 08/May/2025