

	BRACHIARIA RUZIZIENSIS
FICHA TÉCNICA	
Referencia	Pasto tropical
Nombre científico o latín	BRACHIARIA RUZIZIENSIS CV RUZIZIENSIS
Nombre común	Ruziziensis, Ruzi o Acriana.
Ciclo vegetativo	Perenne
Origen	África Central (CIAT 26180)
Forma de crecimiento	Decumbente
Establecimiento	90 a 120 días
Presentación	
Saco	1 kg
Información Técnica	
Altitud MSNM	0 a 1,600 m
Clima	Cálido a Templado
Datos de Siembra	
Siembra	Al voleo, a chuzo, mecanizado
Densidad de siembra por (Ha)	6 a 8 kg
Suelos	Media fertilidad a Alta
Precipitaciones (Rango en mm)	Superior 800 mm
Calidad del Forraje	
Proteína bruta en materia seca	14 - 15%
Digestibilidad	Excelente
Palatabilidad	Excelente
Tolerancia a la sequía	Media
Tolerancia al encharcamiento	Baja
Tolerancia al salivazo	Baja
Producción de Forraje	
Materia verde (ton/ha/año)	50 a 60
Materia seca (ton/ha/año)	10 a 12
Generalidades	
Días entre pastoreos	Después del establecimiento, cada 30 -35 días, se debe retirar el ganado a los 5 o 6 días para evitar el sobrepastoreo dado a su alta palatabilidad.
Recomendación	-
Mezclas	Solo asociar con Marandú o Piatá
Usos	Pastoreo, henificación y abono verde

Registro de importación ICA 5737
 Todas las semillas son seleccionadas y fiscalizadas
 Todos los lotes de semillas salen con pruebas de germinación.
 Distribuido por **AGROACTIVO**
www.agroactivocol.com