ANKER 500 SC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tipo de formulación: Suspensión concentrada SC
Tipo de producto: Fungicida
Ingredientes activos: Iprodione + Pyrimethanil
Grupo químico: Dicarboximidas + Anilino Pirimidinas
Concentración: Iprodione 250 g / l + Pyrimethanil 250 g / l

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Dos ingredientes activos en uno	Mayor protección con menos aplicaciones y a menor costo. Controla varias enfermedades con una sola aplicación
Acción de contacto y traslaminar	Recomendable usarlo preventivamente y en lo primeros síntomas de la enfermedad
Doble mecanismo de acción	No presenta resistencia cruzada y es ideal en programas de rotación
Amplio espectro de control	Actividad preventiva y curativa para varias enfermedades
Formulación liquida	No mancha y preserva la calidad de la planta. Evita la perdida por lluvias

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CLAVEL	**Botrytis** *(Botrytis cinerea)*	1.5 ml / l	6 Horas	N.A.
POMPÓN				
ROSA	**Botrytis** *(Botrytis cinerea)*			
	Mildeo Polvoso *(Sphaeroteca pannosa)*			

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.
P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
N.A: No aplica.

Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo, vapor o aspersión). Causa daño temporal a los ojos. Evite el contacto con la piel y la ropa.
Advertencia: ***"Para aplicaciones aéreas y terrestres se deben respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente, con relación a cuerpos de agua".***
No contamine las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo, no deber ser aplicado directamente al agua.

OBSERVACIONES
Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.
Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico con efecto traslaminar y de contacto, de acción preventiva y curativa.

* Penetra rápidamente en la planta.
* Impide el ingreso del hongo a las áreas sanas de la planta.
* Protege la planta aún en fases avanzadas del hongo deteniendo inmediatamente la enfermedad.

MECANISMO DE ACCIÓN

El Iprodione impide la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio. Inhibe la síntesis del ácido ribonucleico. Impide la secreción de proteínas del patógeno necesarias para el proceso de infección, al tiempo que reduce los niveles de algunas enzimas hidrolíticas que participan en la penetración y en la necrosis de los tejidos afectados. El Pyrimethanil impide la secreción de enzimas del hongo y bloquea la asimilación de nutrientes, deteniendo por lo tanto el tubo germinativo y el crecimiento celular siendo destruida la célula.

PRESENTACIONES 1 litro

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO

DAÑINO