



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Ingrediente activo:** Lambdacihalotrina + Fipronil

**Concentración:** 60 g / l + 250 g / l

**Grupo químico:** Piretroide + Fenilpirazol

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Efecto de choque y alta persistencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Muerte rápida del insecto por deshidratación y cambios fisiológicos secundarios, disminuyendo los daños ocasionados por este</li> <li>* Efecto que perdura hasta por 24 horas</li> </ul>
Doble mecanismo de acción (GABA y Modulador Na)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Posee una alta residualidad, asegurando esto una prolongada acción del producto</li> <li>* Excelente opción de rotación para el manejo de resistencia</li> <li>* Control de un muy amplio rango de plagas foliares y de la superficie del suelo</li> </ul>
Las dosis subletales tienen efecto repelente	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Ofrece ciertas propiedades repelentes</li> <li>* Ocasiona un efecto en el cese de la alimentación</li> </ul>

## RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CEBOLLA (Bulbo)	Minador ( <i>Liriomyza huidobrensis</i> )	200 cc / 200 l ó 600 cc / Ha	12 Horas	15 Días
	Trips ( <i>Thrips tabaci</i> )	150 cc / 200 l ó 450 cc / Ha		
FRÍJOL	Minador ( <i>Liriomyza spp.</i> )	200 cc / 200 l ó 600 cc / Ha		
PAPA	Gusano blanco ( <i>Premnotyphes vorax</i> )	200 - 250 cc / 200 l ó 650 - 740 cc / Ha		
PASTOS*	Chinche de los pastos ( <i>Collaria scenica</i> )	1.0 cc / l ó 200 cc / Ha		
GULUPA	Trips ( <i>Frankliniella spp.</i> )	250 cc / 200 l ó 750 cc / Ha		
CLAVEL ROSA POMPÓN	Trips ( <i>Frankliniella occidentalis</i> )	0.4 cc / l ó 480 cc / Ha	N.A.	

### MODO DE ACCIÓN

CASTA 310 SC actúa por contacto e ingestión y presenta alta residualidad.

### MECANISMO DE ACCIÓN

CASTA 310 SC es un insecticida de amplio espectro, tóxico por contacto e ingestión. Bloquea los receptores GABA e interfiere el paso de los iones cloruro a través de los canales GABAICOS. La Lambdacihalotrina genera un desbalance electroquímico en el axón que impide el paso del impulso nervioso.

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

N.A: No aplica.

\*Para pastos: Evite el pastoreo del ganado hasta 15 días después de la aplicación.

**PRESENTACIONES** 1, 4 y 20 litros, 200 y 500 cc

### OBSERVACIONES

**Fitotoxicidad:** No presenta fitotoxicidad si es empleado en la dosis, cultivos y momento recomendados para su uso.

**Compatibilidad:** Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial bajo la responsabilidad del usuario. **CASTA 310 SC** es incompatible con productos de reacción alcalina.

**EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.**



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO



Registro Nacional ICA No. 879

DISTRIBUIDO POR AGROACTIVO  
www.agroactivocol.com