



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Propineb

Concentración: 700 g / Kg.

Grupo químico: Ditiocarbamatos

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Acción multisitio	* Disminuye la probabilidad de resistencia
Amplio espectro	* Previene varias enfermedades; menor número de aplicaciones por ciclo de cultivo

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CLAVEL	Mancha púrpura o mancha foliar anillada (Cladosporium echinulatum)	2.0 g / l	4 Horas	N.A.
PAPA	Gota (Phytophthora infestans)	1.5 - 2.5 kg / ha	N.A.	7 Días
ROSA	Mildeo veloso (Peronospora sparsa)	2.5 g / l	4 Horas	N.A.

MODO DE ACCIÓN

Acción por contacto. protectante, preventivo.

MECANISMO DE ACCIÓN

Afecta la respiración de los hongos, inhibiendo la germinación de estructuras de reproducción.

P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

N.A.: No aplica.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No ha causado fitotoxicidad en las dosis y cultivos recomendados. No aplicar inmediatamente antes o después de un formulado que contengan cobre ni sobre variedades sensibles al zinc.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba previa.

PRESENTACIONES 400 gramos y 10 kilos

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Registro de Venta ICA No. 0049