

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Hexaconazol

Concentración: 50 g / l

Grupo químico: Triazoles

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Específico para el control de Roya blanca	* Control contundente y definido
Espectro de acción amplio	* Menos aplicaciones, menos costos
Protectante - curativo	* Mayor control

RECOMENDACIONES

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C
CAFÉ	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>)	1 l/Ha	6 horas	15 días
CLAVEL	Mancha anillada (<i>Claosporium echinuleturn</i>)	1.5 - 2.0 cc/l		NA
CRISANTEMO	Roya Blanca (<i>Puccinia thriane</i>)	1 cc/l		NA
FRIJOL	Roya (<i>Uromyces phaseoli</i>)	300 cc/200 l		15 días
MORA	Mildío polvoso (<i>Oidium sp.</i>)	300 - 350 cc/200 l		15 días
ROSA	Mildío Polvoso (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.8 cc/l		NA

P.R.: Periodo de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

P.C.: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

NA: No aplica.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial. SKYP 5 SC presenta incompatibilidad con los plaguicidas que contienen en su formulación fosetil aluminio.

PRESENTACIONES 1 litro

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROMQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Registro Nacional ICA No. 385