

FUNGICIDA TEBUCONAZOLE + TRIFLOXYSTROBIN NATIVO SC 300

Nativo es el fungicida multipropósito, de acción sistémica y mesostémica que ofrece un control confiable para un amplio espectro de enfermedades.

posee un amplio espectro de control para enfermedades como Royas, Oidios y Manchas foliares, gracias a sus dos principios activos que detiene rápidamente el desarrollo del hongo, aportando un fuerte control inicial, aun así, si la enfermedad estuviera presente, provee una acción curativa adicional y evita cepas resistentes, evita la germinación y el desarrollo de las esporas. Tiene un potente efecto preventivo, con excelente acción residual, gracias a la alta afinidad del producto con la cera de la hoja.

COMPOSICION

Suspensión Concentrada Tebuconazole + Trifloxystrobin SC 300 (200+100 g/L)

Beneficios

- Rápida absorción, lo que evita su lavado por lluvias.
- Ofrece máxima flexibilidad y puede ser utilizado en programas de aplicación, aún muy cerca de la cosecha.
- Integra fácilmente a programas de aplicación y estados de desarrollo del cultivo.
- Alta acción curativa, preventiva, erradicativa con excelente residualidad.

Modo de uso

cultivo	enfermedad	Dosis	T.Carencia	Aplicación
Ajo	Roya del ajo (<i>Puccinia allii</i>)	100 cc/hl	20 días	Aplicar preventivamente cuando las condiciones ambientales son predisponentes para la aparición de la enfermedad, o al observar los primeros síntomas.
	Mancha de la hoja (<i>Stemphyllium spp.</i>)			
	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri.</i>)			
Apio	Viruela del apio (<i>Cercospora apii</i>)	100 cc/hl	7 días	Se recomienda aplicar preventivamente cuando se den las condiciones predisponentes o al observar los primeros síntomas.

Cebolla	Mancha de la hoja (<i>Stemphyllium spp.</i>)	100 cc/hl	21 días	Iniciar la aplicación ante la aparición de los primeros síntomas sobre las hojas. En caso de ser necesario repetir el tratamiento a los 14 días.
	Mancha Púrpura (<i>Alternia porri.</i>)			
	Mancha Blanca (<i>Cladosporium allii-cepae</i>)			
Lechuga	Moho gris (<i>Botrytis sp.</i>)	150 cc/hl	5 días	Iniciar los tratamientos a partir de los 30 días del cultivo cuando este tenga 6-7 hoja. Con aplicaciones tempranas puede haber un retraso en el crecimiento del cultivo