

FICHA TÉCNICA



CIVIS

FUNGICIDA SISTÉMICO

USO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

REGISTRO ICA No. 1300

INGREDIENTE ACTIVO

Carbendazim

NOMBRE QUÍMICO

Methyl 1*H*-benzimidazol-2-ylcarbanate de formulación comercial a 20°C.

GRUPO QUÍMICO

Benzimidazoles

CONCENTRACION Y FORMULACIÓN

50% p/v, 500 g/L Suspensión concentrada

MECANISMO DE ACCIÓN

Fungicida sistémico

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Fungicida del grupo de los Benzimidazoles, de amplio espectro con actividad fungicida sobre hongos de las clases:

Deuteromycetos, como: *Botrytis spp*, *Alternaria spp*, *Fusarium spp*, Ascomycetos, como: *Sphaerotheca spp*, *Venturia spp*, y algunos Basidiomycetos, como: *Rhizoctonia spp*.

CIVIS 500 SC es un fungicida sistémico, de rápida penetración con amplio espectro de control que combina el efecto preventivo y curativo.

Aplicado sobre las plantas, actúa como barrera a la penetración de los patógenos e impide el desarrollo de la enfermedad. También es absorbido por las hojas y raíz, de forma acropetala o ascendente y se distribuye por el interior de la planta donde ejerce su efecto curativo.

CIVIS 500 SC inhibe el desarrollo del tubo germinativo, la formación de apresorios y el crecimiento del micelio de hongos fitopatógenos.

APLICACIÓN

Antes de la aplicación del producto realizar un monitoreo para identificar los niveles de la enfermedad de acuerdo

al programa de manejo, aplicar la mayor dosis cuando los niveles de infestación de la enfermedad sea alto y para garantizar un periodo de acción más prolongado. Se puede aplicar antes o durante la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

CIVIS 500 SC debe aplicarse por vía aérea o terrestre utilizando bombas de espalda o estacionarias, siguiendo los métodos de calibración recomendados por el respectivo fabricante, utilizando la dosis recomendada por el ingeniero agrónomo de conformidad con el nivel de infestación en el cultivo.

Se deben hacer evaluaciones del producto después de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

CIVIS 500 SC no debe mezclarse con productos plaguicidas, surfactantes o fertilizantes foliares sin antes realizar una prueba de compatibilidad.

CIVIS 500 SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas en esta etiqueta.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



FICHA TÉCNICA



CIVIS
FUNGICIDA SISTÉMICO
USO AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)
REGISTRO ICA No. 1300

INGREDIENTE ACTIVO

Carbendazim

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.R.	P.C.
ARROZ	Complejo manchado de grano (<i>Helminthosporium oryzae</i> , <i>Cercospora Oryzae</i> y <i>Alternaria padwickii</i>)	600 - 700 cm ³ /Ha	12 Horas	14 días
FRÍJOL	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	100 cm ³ / 200 L de agua	12 Horas	14 días

P.R.: Periodo de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado.

P.C.: Periodo de carencia: número de días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

EFFECTO SOBRE OTROS CULTIVOS SUCESIVOS

CIVIS 500 SC no tiene ningún efecto perjudicial sobre cultivos sucesivos ni sobre otros cultivos, sin embargo, para evitar la resistencia que puedan presentar las plagas se debe tener en cuenta un programa especial de manejo integrado de cultivos.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
BOGOTÁ (57-1) 288 6012 FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 0916012



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
 LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO

