

DORPHUM
FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE (WP)
REGISTRO ICA No. 0980

**INGREDIENTES ACTIVOS:**

Flumorph + Mancozeb (10% + 50%).

GRUPOS QUÍMICOS

Morfolinas + Ditiocarbamatos.

MECANISMO DE ACCIÓN

FLUMORPH, inhibe la síntesis de ergosterol (inhibición isomerización $\Delta 8 \rightarrow \Delta 7$ y la reducción del esteroide por inhibición de esterol-D14 -reductasa).

MANCOZEB Altera numerosos procesos bioquímicos enzimáticos indispensables para respiración y transporte de energía en las células.

MODO DE ACCIÓN

Fungicida con acción protectante, curativo y antiesporulante.

CULTIVO	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
CEBOLLA (Bulbo)	Mildeo veloso (<i>Peronospera destructor</i>)	330 - 200 L o 990 g/Ha	2 Horas	14 días
PAPA	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	330 - 200 L o 990 g/Ha	2 Horas	14 días
ROSA	Mildeo veloso (<i>Peronospera sparsa</i>)	1.5 g/L o 1800 g/Ha	2 Horas	N.A.
TOMATE	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	330 - 200 L o 990 g/Ha	2 Horas	14 días

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM
BOGOTÁ (57-1) 288 6012 FUERA DE BOGOTÁ 01 8000 0916012



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III
 LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO

