

FICHA TÉCNICA

PANACUR® 10% Fenbendazol 100 mg Suspensión oral

Composición:

Cada 1 ml contiene:

Fenbendazol 100 mg

Excipientes c.s.p. 1 mL

Indicaciones de uso:

Antihelmíntico de amplio espectro contra parásitos gastrointestinales y pulmonares, en fase de maduración sexual (vermicida), formas juveniles inmaduras y tardías (larvicida) y acción sobre los huevos. En perros tiene además una acción antiprotozoaria contra *Giardia*.

Bovinos: *Ostertagia spp.*, *Cooperia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Haemonchus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Bunostomum spp.* y *Dictyocaulus viviparus*. También es efectivo contra larvas inhibidas de *Ostertagia spp.*

Ovinos: *Ostertagia spp.*, *Haemonchus spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Nematodirus spp.*, *Cooperia spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *chabertia spp.*, *Bunostomum spp.*, *Dictyocaulus filaria*. También es efectivo contra la tenia de *Moniezia spp.* Y en algunas ocasiones contra *Trichuris spp.*

Caballos: Grandes Estrongilos (adultos y larvas migratorias de *S. vulgaris*, adultos y larva tisular de *S. edentatus*), pequeños Estrongilos inmaduros y adultos (*Cyathostomes*), *Oxyuris spp.*, *Strongyloides spp.*, *Parascaris equorum* y tiene efecto ovicida sobre huevos de nemátodos.

Perros: *Ancylostoma caninum*, *Toxocara canis* y *Giardia spp.*

Especies de destino:

Bovinos, ovinos, caballos y perros.

Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo:

Se aplica por vía oral mediante el empleo de un dispositivo (pistola dosificadora, botella, jeringa o sonda) el cual no se encuentra incluido en el producto.

Dosis:

Bovinos	5 mL por 100 kg de peso (5 mg/kg) en dosis única
Equinos	7,5 mL por 100 kg de peso (7,5 mg/kg) en dosis única
Ovinos	3,0 mL por 50 kg de peso (6 mg/kg) en dosis única
Perros	0,5 mL/kg de peso (50 mg/kg) en dosis única diaria por 3 días (control de nematodos y <i>Giardia</i>)

Contraindicaciones:

No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida.

No usar en perros durante las etapas de gestación y lactancia.

PANACUR® 10%
Suspensión oral

FICHA TÉCNICA

Advertencias y precauciones especiales de uso:

Agitar bien antes de usar.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Interacciones con otros productos farmacéuticos:

No administrar conjuntamente con los derivados bromados de salicilanilida.

Efectos no deseados o reacciones adversas:

No se han descrito.

Período de resguardo:

Bovinos: Carne: 11 días; Leche: 4 días.

Ovinos: Carne: 12 días; Leche: 6 días.

Caballos: No administrar a caballos destinados a consumo humano.

Precauciones especiales para el operador:

Ninguna.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

Utilizar inmediatamente una vez abierto y descartar el producto sobrante.

Presentaciones:

Fascos multidosis de 100 mL, 250 mL, 1 L, 2,5 L y 5 L.

Fabricado por:

Merck Sharp & Dohme Saúde Animal Ltda.

Coronel Bento Soares, 530 – Cruzeiro, Sao Paulo,

Brasil

Importado y distribuido por:

Intervet Chile Ltda.

Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile.

Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda.

USO VETERINARIO

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA

Reg SAG N°1006