

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente activo: Bispiribac Sódico

Concentración: 100 g / l

Grupo químico: Pirimidil Oxibenzoico

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Se absorbe por la raíz y follaje	* Mayor control
Amplio espectro	* Controla malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas
Sistémico, Post-emergente	* Menor lavado por la lluvia, economía, excelente sello
Selectivo al arroz	* Mayor confiabilidad en el uso

RECOMENDACIONES

CULTIVOS	BLANCO BIOLÓGICO	DOSIS	PR.	P.C.
ARROZ	<p>MALEZAS GRAMÍNEAS Y CIPERÁCEAS</p> <p>Arrocillo (<i>Fimbristylis annua</i>)</p> <p>Barba de indio (<i>Fimbristylis milacea</i>)</p> <p>Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>)</p> <p>Cortadera (<i>Cyperus esculentum</i> o (<i>Cyperus iria</i>))</p> <p>Espadilla (<i>Corchorus orinocensis</i>)</p> <p>Frijolillo (<i>Phaseolus lathyroides</i>)</p> <p>Guardarrocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>)</p> <p>Liendre puerco - Paja de pato (<i>Echinochloa colonum</i>)</p> <p>Palo de agua (<i>Ludwigia limifolia</i>)</p> <p>Piñita (<i>Murdannia nudiflora</i>)</p> <p>Tamarindillo (<i>Aeschynomene sp</i>)</p>	0.4 - 0.5 l / ha	Cuando se seque el follaje	60 Días

MODO DE ACCIÓN

BIRIBAC 100 SC herbicida de acción sistémico post-emergente.

MECANISMO DE ACCIÓN

BIRIBAC 100 SC actúa como inhibidor de la cadena de aminoácidos (ALS o AHAS).

NOTA: Es indispensable el uso de un coadyuvante tensoactivo en la dosis recomendada por su respectivo fabricante, para el buen desempeño de BIRIBAC 100 SC.

OBSERVACIONES

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.

Compatibilidad: Se recomienda hacer una prueba de mezcla previa a la preparación comercial y pruebas de fitocompatibilidad a pequeña escala antes de la aplicación comercial. Es compatible con herbicidas de otros grupos químicos, excepto con Propanil y Tridipor por presentar antagonismo en el control de ciertas malezas.

PRESENTACIONES 1 y 4 litros

PR.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.
P.C.: Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
N.A.: No aplica.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS CISPROQUIM 01 8000 916 012 FUERA DE BOGOTÁ. EN BOGOTÁ COMUNICARSE CON EL TELÉFONO 2886012.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Registro Nacional ICA No. 395