

BOTRIMIL AGRISAN

FICHA TÉCNICA

Tipo	Fungicida de origen vegetal
Ingrediente activo	Carvacol + timol + citral
Grupo químico	Extracto vegetal
Concentración	90% SL (CONCENTRADO SOLUBLE)
Modo de acción	Contacto, preventivo
Fabricante	ABONOS SUPERIOR LTDA
Toxicidad	Grupo IV ligeramente tóxico DL50: No determinada Etiqueta con franja de color VERDE Palabra: PRECAUCIÓN
Antídoto	No existe un antídoto específico
No DE REGISTRO DE VENTA ICA	9578

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

BOTRIMIL AGRISAN es un fungicida botánico de amplio espectro, obtenido a partir de extractos vegetales homogenizados en una base oleosa orgánica que se mezcla fácil con el agua, es completamente orgánico, rápidamente biodegradable e inócuo para el hombre y el medio ambiente, desarrollado para proteger de algunas enfermedades a flores, frutales, hortalizas, algodón y plantas ornamentales. Actúa como endoelcitor y exoelcitor por los metabolitos presentes en los extractos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Hacer la preparación directamente en el tanque de la aspersora colocando primero la mitad del agua recomendada, luego la dosis de **BOTRIMIL AGRISAN** y posteriormente, agregar agua hasta completar el volumen de la mezcla.

COMPATIBILIDAD

BOTRIMIL AGRISAN es compatible con otros productos de uso común en los cultivos, sin embargo, en caso de duda se recomienda hacer una premezcla para observar compatibilidad física.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	OBSERVACIONES
FLORES	Follaje: 7 cc/litro de agua 7 cc por litro de agua cada cuatro días bajo condiciones de alta severidad y un clima favorable para el patógeno. Como preventivo 4 cc por litro de agua en el programa de rotación. PROBLEMAS: Botritis (<i>Botrytis sp</i>) y mildew polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)

**HORTALIZAS
ORNAMENTALES
FRUTALES
ALGODÓN**

Suelo: 2 l/ha, 200 cc/20 l de agua o 2 l/caneca de 55 galones

Follaje: 1 l/ha, 100 cc/20 l de agua o 1 l/caneca de 55 galones

Se recomienda realizar las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde. La aplicación recomendada es preventiva cada 15 días y en aparición de síntomas o para control se recomienda tres aplicaciones. Frecuencia semanal con 10 cc por litro de agua.

PROBLEMAS: Botritis (*Botrytis sp*) y mildew polvoso (*Sphaeroteca pannosa*)

FITOTOXICIDAD

BOTRIMIL AGRISAN no es fitotóxico en los cultivos recomendados cuando es usado de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

PERIODOS DE CARENCIA: No hay restricción

REINGRESO AL ÁREA DE ENTRADA: No hay restricción

TOLERANCIAS: No hay restricción

PRESENTACIÓN: 1, 4 y 20 litros