



FT 8026
Actualizada:
2022-05-03
Versión: 2

FICHA TECNICA

PRQTECTOR®_{W.P.} es un fungicida producido con una cepa patógena natural y selectiva de *Trichoderma harzianum*. Capaz de controlar, parasitar y causar un efecto antagónico a hongos fitopatógenos regulando la enfermedad y deteniendo el daño.

1. COMPOSICIÓN GARANTIZADA.

Composición Garantizada	<i>Trichoderma harzianum</i> Mínimo: 2.0 x 10 ⁸ Conidias/gramo
	<i>Trichoderma harzianum</i> Mínimo: 1.6 x 10 ⁸ Colonias/gramo
Porcentaje de Pureza Microbiológica:	Mínimo: 95%.
pH:	4.5 – 8.0
Hidratabilidad:	Máximo: 50 minutos.
Humedad:	Máximo: 8%
Granulometría:	Mínimo: 70% Partículas Inferiores o Iguales a 45 micras.
Formulación:	Polvo mojable

2. CULTIVOS Y DOSIS.

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS
Aguacate	Pudrición de Raíz: <i>Phytophthora sp.</i>	1 – 2 g/L
Aromáticas	Pudrición de Raíces: <i>Fusarium sp.</i>	1 – 2 g/L
Arroz	Pudrición de la vaina, Pudrición radicular: <i>Rhizoctonia solani.</i> , <i>Fusarium sp.</i> , <i>Sclerotinia sp</i>	1 – 2 g/L
Arveja	Pudrición de Raíces: <i>Fusarium sp.</i>	1 – 2 g/L
Banco de flores	Damping off. Pudrición de tallos y raíces: <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Phyitium sp.</i> , <i>Fusarium sp.</i> , <i>Sclerotinia sp.</i> , <i>Botrytis sp.</i>	20 g / Cama y drench (Repetir a los 20 días)
Caña de Azúcar	Pudrición de raíces y yemas: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Botrytis cinerea</i>	1 – 2 g/L
Frutales	Llaga y pudrición de raíces: <i>Rosellinia sp.</i> , <i>Armillaria sp.</i>	1 – 2 g/L



FT 8026
Actualizada:
2022-05-03
Versión: 2

FICHA TECNICA

Hortalizas	Damping off, pudrición de raíces: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Sclerotinia sp.</i>	1 – 2 g/L
Maíz, Sorgo y Soya	Damping off: <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Fusarium sp.</i>	1 – 2 g/L
Papa y Yuca	Pudrición de raíces y tubérculos: <i>Rosellinia sp.</i> , <i>Rhizoctonia sp.</i>	1 – 2 g/L
Semilleros y Almacigos	Damping off, pudrición de raíces: <i>Rhizoctonia sp.</i> , <i>Phytium sp.</i> , <i>Fusarium sp.</i> , <i>Sclerotinia sp.</i> , <i>Botrytis sp.</i>	1 – 2 g/L
Tabaco	Pudrición de Raíces: <i>Fusarium sp.</i> , <i>Phytium sp.</i> , <i>Phytophthora sp.</i>	1 – 2 g/L

3. PRESENTACIÓN.

- Empaque 200g
- Empaque 500g
- Empaque 1Kg
- Empaque 20Kg

4. CONSERVACIÓN.

Para almacenamiento inferior a 6 meses, manténgase a temperatura ambiente, no mayor a 25 °C; Para almacenamiento de 12 meses, manténgase refrigerado entre 2 °C y 9 °C.

5. CATEGORIA TOXICOLOGICA.



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV
LIGERAMENTE TOXICO



6. COMPATIBILIDADES.

- Puede usarse en mezcla con Insecticidas y Herbicidas.
- No debe usarse en mezcla con Fungicidas.
- Puede usarse con Coadyuvantes que no tengan alcohol.

7. PRECAUCIONES.

- Fungicida de uso agrícola.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No congelar.
- Destruir el envase y sus componentes después de usado.

El periodo de reingreso: tiempo entre la aplicación y el reingreso al lote es de 1 hora.

El periodo de carencia: tiempo desde la aplicación hasta la cosecha es de 1 hora



FT 8026
Actualizada:
2022-05-03
Versión: 2

FICHA TECNICA

8. No-GMO1.

Los insumos e ingredientes utilizados en la fabricación de **PRQTECTOR®_{WP}** no fueron producidos usando técnicas de ingeniería genética y no son derivados de organismos modificados genéticamente.